



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
Zakład Diagnostyki Obrazowej**

Przygotowanie do badania Tomografii Komputerowej

- Na badanie pacjent zgłasza się na czczo minimum 6 godz. po posiłku. Po zgłoszeniu na badanie w rejestracji pacjent kierowany jest do pracowni TK.
- Zależnie od celu badania przy badaniu KT jamy brzusznej i miednicy może być konieczne doustne podanie środka kontrastującego w czasie do 1,5 godziny przed badaniem (czasem również podaje się środek kontrastujący doodbytniczo).
- Zaleca się picie dużej ilości płynów w dniu poprzedzającym badanie oraz po badaniu.
- Na badanie jamy brzusznej, miednicy należy przynieść ze sobą butelkę wody niegazowanej (min. 1,5 l)
- W przypadku badania jamy brzusznej w kierunku kamicy zaleca się picie dużej ilości wody i zgłoszenie się na badanie z pełnym pęcherzem.
- U pacjentów zażywających metforminę (Formelie, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Metifor, Siofor, Metforatio), należy postępować jak wyżej.
- Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, KT, MR opisy ze zdjęciami lub płytą CD) oraz badania chemiczne: mocznik, kreatynina i GFR.
- Pacjenci z cukrzycą powinni zabrać ze sobą śniadanie i leki.
- W dniu badania należy zażyć leki, które są na stałe przyjmowane, popijając małą ilością wody niegazowanej.
- Po podaniu środka kontrastującego mogą wystąpić objawy niepożądane: nudności, wymioty, pokrzywka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, drgawki, napad padaczkowy, wstrząs, zatrzymanie krążenia. Dlatego po zakończeniu badania pacjent z założonym wenflonem pozostaje w poczekalni pod obserwacją pielęgniarki przez ok. 30 minut.
- Jeśli pacjent po w/w czasie czuje się dobrze i nie wystąpiły u niego powikłania pielęgniarka usuwa wenflon.